



國立臺東專科學校

National Taitung Junior College

# 實習實驗場所 急救箱備置注意事項

---

113年11月由總務處環境安全衛生組提供

# 急救箱清單

項次	名稱	數量	項次	名稱	數量
1	消毒紗布	2 包	7	優碘溶液	1 罐
2	棉花棒	1 包	8	普通剪刀	1 把
3	透氣膠帶	1 捲	9	無鉤鑷子	1 把
4	伸縮膠布(OK繃)	5 片	10	三角巾	1 條
5	繃帶	1 捲	11	止血帶	1 條
6	生理食鹽水	3 小 瓶			

以食品科化學實驗室為例

國立臺東專科學校

口罩  
(依單位性質備置)

生理食鹽水

三角巾

鑷子

無菌棉枝



OK 蹦

優碘

無菌紗布

醫療紙膠

止血帶

# 備置注意事項

---

1. 請拿清單至藥局採購，並請藥局人員提供最新有效期限醫療衛材。
2. 每年5月及11月實施急救箱醫療衛材盤點，請確實盤點有效日期及衛材品質。
3. 盤點完後請繳交至總務處環境安全衛生組，環安衛組會掃瞄存查及核章，正本返還後請放置於急救箱內保存3年備查。
4. 急救箱放置處，需有顯眼標籤，且急救箱上需張貼急救箱清單。
5. 如非必要，不要額外放置藥品。

# 範例

← 逃生

急救箱

顯眼標籤

急救箱內容物清單					
項次	名稱	數量	項次	名稱	數量
1	消毒紗布	1 包	7	優碘溶液	1 罐
2	棉花棒	1 包	8	普通剪刀	0 把
3	透氣膠帶	1 捲	9	無鈎鑷子	1 把
4	伸縮膠布(OK繃)	10 片	10	三角巾	1 條
5	繃帶	0 捲	11	止血帶	1 條
6	生理食鹽水	5 罐	化學		

113年10月

急救箱上張貼急救箱清單



# 藥 品 備 置

- 如非必要，請勿放置藥品，會有違反藥事法疑慮，更甚者會遇到用藥者過敏致死風險。
- 如覺得真有必要的话，請經過職醫評估後，開立藥囑單方可備藥。

# 藥品分級制度

## 處方藥品

須由醫師診斷後開立處方箋再由藥師調劑給藥、指導用藥方法及注意事項

## 指示藥品

須經醫師、藥師或藥劑生指示，並依仿單(說明書)方法使用

## 甲類成藥

可自行購買，僅在藥師、藥劑生管理藥店提供


## 乙類成藥

可於一般社區藥局或藥品販賣業中自由取得



# 藥品包裝會註明藥品分級

本藥須由醫師處方使用  
適用藥害救濟制度  
衛署藥製字第032571號  
G-4779號



國

學校

# 如何選擇生理食鹽水

請選擇「沖洗用」生理食鹽水，勿採購「緩衝生理食鹽水」



# 生理食鹽水仿單

110\*254mm

## 三熾心藥 緩衝生理食鹽水 "AIM" Buffer Saline

**特性：**  
三熾心藥緩衝生理食鹽水是專為隱形眼鏡配製之無菌、緩衝、等張溶液，不含任何防腐劑。

**成分：**  
每ml中含有  
Sodium Chloride.....7.1mg  
Sodium Borate.....0.43mg  
Boric Acid.....4.3mg  
Distilled Water Added to Make.....1ml

**用途：**  
隱形眼鏡之浸泡、沖洗、保存、中和。

**使用方法：**  
1.用於藥水消毒法時，鏡片先用清潔液搓洗後，以本品將鏡片沖洗乾淨，然後浸泡於浸泡液中，戴用鏡片前再以本品將浸泡液沖淨後配戴。  
2.用於加熱消毒法時，鏡片用清潔液搓洗後，以本品將鏡片沖淨，並浸泡於注滿本品之鏡片盒中，蓋緊盒蓋，然後放入加熱消毒器中消毒，俟鏡片盒冷卻後，取出鏡片使用。

**注意事項：**  
1.使用時勿接觸瓶口，以免污染溶液。  
2.請將本品保存於室溫下。  
3.本品不可重覆使用。

**包裝：**  
10ml 塑膠瓶裝。

衛部醫器製字第004314號



5A42©

## 三熾心藥 緩衝生理食鹽水 "AIM" Buffer Saline

**特性：**  
三熾心藥緩衝生理食鹽水是專為隱形眼鏡配製之無菌、緩衝、等張溶液，不含任何防腐劑。

**成分：**  
每ml中含有  
Sodium Chloride.....7.1mg  
Sodium Borate.....0.43mg  
Boric Acid.....4.3mg  
Distilled Water Added to Make.....1ml

**用途：**  
隱形眼鏡之浸泡、沖洗、保存、中和。

## AIM Clean Saline Solution

衛部醫器製字第005481號

使用前請務必詳閱原廠之使用說明書並遵照指示使用。本產品為組成簡單的等張溶液，以物理作用方式用於皮膚、表淺創傷面、黏膜的洗淨。

**【成分】：**  
Each mL contains:  
Sodium Chloride ..... 9 mg  
Distilled water added to ..... 1 mL

**【用途】：**  
用於皮膚、表淺創傷面、黏膜的洗淨。

尺寸：110\*254mm

## AIM Clean Saline Solution

衛部醫器製字第005481號

使用前請務必詳閱原廠之使用說明書並遵照指示使用。本產品為組成簡單的等張溶液，以物理作用方式用於皮膚、表淺創傷面、黏膜的洗淨。

**【成分】：**  
Each mL contains:  
Sodium Chloride ..... 9 mg  
Distilled water added to ..... 1 mL

**【用途】：**  
用於皮膚、表淺創傷面、黏膜的洗淨。

**【注意事項】：**  
1. 本產品於運銷過程中，可能因受撞擊，致使容器產生破裂、縫隙、受污染。故有內容物不澄清或有異物，或包裝有損壞現象時，請勿使用。  
2. 為防止兒童誤食，請妥善保管。  
3. 使用前請洗淨雙手。請勿直接碰觸內容物沖出口，以防污染。  
4. 本品為一次性使用商品，開封後即非無菌狀態。未使用完之溶液，請勿繼續使用。

**【貯存】：**請儲存於25℃以下，並避免陽光及日光燈直射，不要置於高溫環境或冰箱中。  
**【包裝】：**5毫升×8瓶、10毫升×8瓶、15毫升×8瓶塑膠瓶裝。  
5毫升×16瓶、10毫升×16瓶、15毫升×16瓶塑膠瓶裝。  
**【有效期間】：**2年(請見外箱或標籤上之標示)。


藥商名稱  
藥商地址  
製造廠名稱  
製造廠地址

5A55©

國立臺東專科學校

常見狀況

# 放置過期



# 變質發霉及開封衛材未移除



常見 Q & A

Q：單位內發生的傷病都是小傷口，  
且沒有大型機具，  
請問三角巾及止血帶還需要準備嗎？

Ans：

表單上清單可稍微調整，

如沒有大型機具可暫時不備用，

如有備用請用密封乾淨袋子裝袋，保持乾燥乾淨。

# Q：可以直接買現成的醫藥箱嗎？

Ans：

基本上不建議，部分現成的醫藥箱內容物會包含醫師指示用藥及不符合實際需要之藥水，購買後還須將醫師指示用藥(膏)取出，並可能需要額外購買一些醫材，**故建議直接拿清單跟藥局購買。**

## 不建議備置藥品



Q：受傷塗抹一些藥膏很有用，  
可以購買藥膏放置醫藥箱嗎？

---

Ans：

目前藥品有分為處方藥品、指示藥品、甲類成藥、乙類成藥，基本最多能放的只有乙類成藥，大部分藥膏是處方藥品、指示藥品，是無法提供的。

T H E E N D

國立臺東專科學校